

Citas: Goodman G H. Dermatol Surg. 2012;38 (8):1302–1309.  
Goodman G H. Dermatol Surg 2012;38: (8) 1310–1321.

Título: Tratamiento de las cicatrices de acné: abordaje de la superficie, volumen y movimiento para obtener resultados expeditivos y óptimos. Parte 1 grados leves de acné cicatrizal. Parte 2 grados más severos de acné cicatrizal.

Autores: Goodman G H. MD.

Procedencia: Monash University, Clayton. Australia.

Respecto al tratamiento de las cicatrices de acné surge el desafío del dermatólogo de elegir aquel que será más adecuado para las secuelas de un paciente en particular y poder adaptar varias modalidades de tratamiento incluso en un mismo paciente.

Los autores describen una estrategia en alza utilizada para clasificar el grado de afectación cicatrizal en los pacientes, tomando en cuenta los efectos del movimiento (mímica), volumen, y cambios en la superficie cutánea; en los pacientes que envejecen o poseen otras enfermedades, junto a una descripción de la fisiopatogenia de las cicatrices de acné y las técnicas quirúrgicas para su corrección.

Los autores a través de ésta clasificación de severidad definen “el plan de tratamiento” del acné cicatrizal que más se adecue a cada paciente.

Los autores concluyen de acuerdo al grado de severidad de la enfermedad cicatrizal (leve o severa) será la complejidad del tratamiento con mayor probabilidad de combinación múltiples técnicas en un mismo paciente en los casos más severos.

Consideramos de interés el artículo como una guía para enriquecer el arsenal terapéutico del manejo quirúrgico de las cicatrices de acné siempre considerando que la meta es la mejoría visual de las lesiones y no su erradicación.