

Gonorrea. Información para pacientes

La gonorrea es una infección causada por la bacteria *Neisseria Gonorrhoeae*. Pueden tenerla tanto mujeres como varones, y puede causar infección de la uretra, el cuello del útero, el recto y la garganta.

Se transmite a través de relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin preservativo con una persona con gonorrea. También, puede transmitirse de madre a hijo durante el parto.

Muchas personas pueden no presentar síntomas, especialmente cuando la infección es en el recto o la garganta. Los síntomas pueden incluir secreción uretral en el varón, flujo vaginal verdoso o amarillento y ardor al orinar. En la mujer, también puede contener sangrado después de las relaciones sexuales o entre los períodos de menstruación y dolor abdominal o pélvico. En el varón, dolor testicular o aumento de tamaño.

Aunque a menudo no haya síntomas con la infección rectal, éstos pueden incluir molestias, picazón, dolor, flujo o sangrado del ano. La Infección de la garganta puede presentarse con dolor.

Se detecta al analizar las secreciones de la uretra, la vagina, el ano o la garganta.

Se trata y cura con antibióticos.

Si la gonorrea no se trata, puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH.

En la mujer puede invadir el área pélvica e infectar el útero, las trompas de Falopio o los ovarios causando la EPI (Enfermedad Pélvica Inflamatoria). En el varón, la gonorrea puede afectar los testículos, causando hinchazón y dolor y también puede causar infertilidad.

Se previene usando preservativo o campo de látex en todas las relaciones sexuales.